

Bijregelschema

zonder basisschema

Naam patiënt: _____

Geboortedatum: _____

Datum: _____

Naam:

diabetesverpleegkundige/

praktijkondersteuner: _____

Telefoonnummer: _____

U corrigeert een afwijkende bloedglucose door het bijspuiten van kortwerkende insuline (Novorapid/Humalog/Apidra/Fiasp) **vóór de maaltijd**.

Correctieschema	
Glucose in mmol/l is:	Corrigeren met kortwerkende insuline: Novorapid, Humalog, Apidra, Fiasp met:
Tussen 11 en 15 Eenheden
Tussen 15 en 20 Eenheden
Hoger dan 20 Eenheden
Glucose voor de nacht in mmol/l	
Lager dan 4	4 tabletten druivensuiker/ranja + 15gram koolhydraten
Tussen 4 en 6	15 gram koolhydraten (= boterham/2 beschuiten/1 beschuit + glas melk)
Tussen 6 en 7	7 gram koolhydraten (= 1 beschuit/glas melk)
Glucose voor de nacht in mmol/l:	
>	+ Eenheden kortwerkende insuline
>	+ Eenheden kortwerkende insuline
Let op:	
<ul style="list-style-type: none"> • Voor de nacht maximaal met 4 eenheden bijregelen. • Bijregelen met <u>kortwerkende insuline</u>: Novorapid/Humalog/Apidra/Fiasp • <u>Niet bijregelen</u> voor de nacht bij prednison gebruik of lage nuchtere waardes 	